

¿CÓMO SE TRATA LA INFECCIÓN POR ROTAVIRUS?



El tratamiento es inespecífico, y consiste principalmente en la terapia de rehidratación oral para prevenir la deshidratación, que es la principal causante de hospitalización. También el tratamiento incluye el manejo de los síntomas asociados, por ejemplo, medicamentos para bajar la fiebre si fuesen necesarios.

¿Cómo prevenir las infecciones por Rotavirus?



Mantener siempre un buen consumo de agua.



Lavarse las manos frecuentemente, especialmente después de utilizar el baño o hacer cambio de pañal.



Consulte a su médico para poder informarse sobre las vacunas que están disponibles para prevenir estas infecciones, para quiénes y cuándo están

Consulte siempre a su médico, especialmente cuando su hijo:

- Tiene diarrea durante más de 24 horas.
- Tiene episodios frecuentes de vómitos.
- Tiene heces alquitranadas o negras, o heces que contienen sangre o pus.
- Tiene una temperatura de 40 °C o superior.
- Pareciera sin energía, irritable o con dolores.
- Presenta signos o síntomas de deshidratación.



Referencias:

- <https://www.cdc.gov/rotavirus/clinical-sp.html>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/rotavirus/symptoms-causes/syc-20351300>

Material dirigido a Público General

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EE. UU. y sus filiales. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total. Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. Teléfono (+56) 226 558 800 | www.msdchile.cl | dpoc.chile@msd.com

02/28 - CL-ROT-00005



¿QUÉ ES EL ROTAVIRUS?



Es un virus muy contagioso y es la causa más común de diarrea en niños.



Los adultos también pueden infectarse, aunque la enfermedad tiende a ser más leve.



Las tasas más altas de enfermedad ocurren en los **bebés y los niños pequeños**, y la mayoría de **los niños se infectan antes de los 5 años de edad**.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PUEDE PROVOCAR EL ROTAVIRUS?



Los síntomas iniciales son **fiebre y vómitos**, seguidos de tres a ocho días de **diarrea** acuosa. La infección también puede causar **dolor abdominal**.



Otros síntomas pueden incluir la **pérdida del apetito** y deshidratación.

COMPLICACIONES



La diarrea puede llevar a la deshidratación, en especial, en niños pequeños. Si no se trata, la deshidratación puede convertirse en una afección potencialmente severa, independientemente de su causa. Los síntomas de deshidratación incluyen:

- Reducción de la cantidad de visitas al baño para orinar (en los niños)
- Tener los pañales secos durante varias horas seguidas (en los bebés)
- Llorar sin lágrimas
- Boca y lengua secas
- Tener sed
- Estar irritable
- Estar muy cansado
- Tener los ojos hundidos
- Tener la piel seca
- Tener las fontanelas hundidas (zona que aparece ligeramente hundida en el cráneo, donde los huesos aún no se han cerrado bien en el caso de los bebés)

CÓMO SE TRANSMITE?

El principal modo de transmisión es por vía fecal-oral, generalmente a través del contacto directo con personas infectadas antes y después de que presenten síntomas de la enfermedad.

Dado que el virus es viable en el medio ambiente por un tiempo, la transmisión también puede ocurrir a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados y el contacto con superficies u objetos contaminados.

Con frecuencia, el rotavirus se diagnostica en base a sus síntomas y al resultado de un examen físico. En ocasiones podría tomarse una muestra de heces en un laboratorio para confirmar el diagnóstico.

